

**Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur - OVDAS**



<b>REGION</b>	Los Lagos		
<b>RAV No.</b>	27	<b>Fecha - Hora</b>	15 de mayo de 2015 16:00 HL
<b>Periodo Evaluado:</b>	14 mayo (15:00 HL)	15 mayo (15:00 HL)	
<b>Volcán</b>	Calbuco	<b>GVP ID</b>	358020
<b>RAV anterior</b>	ROJA	<b>Alerta actual</b>	ROJA

**1. OBSERVACIONES**

**1.1 Vigilancia volcánica:**

**1.1.1 Actividad sísmica:** Continúa el registro de actividad sísmica asociada al movimiento de fluidos al interior del volcán, la señal de tremor ha permanecido en niveles considerados bajos con valores de Desplazamiento Reducido [DR, parámetro que indica el tamaño de la señal sísmica en el origen] iguales o menores a 1,7 cm<sup>2</sup>. Además, se registraron trece (13) eventos tipo Largo Periodo, con magnitudes locales [M<sub>L</sub>, medida del tamaño de los sismos con base en las características de la amplitud y frecuencia de la onda sísmica] iguales y menores a 2,2 y desplazamientos reducidos (DR) menores a 26,5 cm<sup>2</sup>, valores considerados moderados para este volcán. Respecto a la sismicidad de tipo VT [asociado con ruptura de roca] se registró un (1) evento con una magnitud local (M<sub>L</sub>) de 0,1.

No. Eventos	ML Max VT / DR Max LP	TR DR máximo
1 VT 13 LP	0,1 /26,5 cm <sup>2</sup>	1,7 cm <sup>2</sup>

**Observaciones:** Se mantienen bajos niveles de sismicidad asociados a la dinámica del volcán. El sismo VT debido su baja energía, se dificulta para obtener una localización.

**1.1.2 Actividad superficial**

Columna Altura (km)	Dirección principal	Pluma Distancia (km)	Fuente información
-	-	-	Cámara IP ULMO

Incandescencia	-	Altura máxima (km)	-
----------------	---	--------------------	---


**Observaciones:** Debido a las condiciones meteorológicas, no fue posible visualizar el cráter del volcán mediante las cámaras IP.

**1.1.3 Otras Observaciones:**

El sitio MIROVA (<http://www.mirovaweb.it/>) no ha reportado alerta de anomalía termal.

**2. Peligro**

El volcán Calbuco corresponde a unos de los volcanes de mayor riesgo específico del país. Su etapa evolutiva más reciente (últimos 14.500 años) se inicia con un evento de colapso volcánico, el cual generó un anfiteatro de 2 km de diámetro. Los eventos eruptivos posteriores han comprendido erupciones tanto efusivas como explosivas, estas últimas eventualmente plinianas y responsables de la generación del mayor depósito de flujo piroclástico del volcán, el cual alcanza inclusive la localidad de Puerto Montt, distante a más de 30 km. Durante la prehistoria reciente se generó un gran cráter hacia la cumbre del edificio moderno, de hasta 1.5 km de diámetro, con una escotadura más baja hacia el noreste. Desde el año 1893 se comenzó a construir una secuencia de domos dentro del anfiteatro de colapso eruptivo, la cual continuó su construcción durante las erupciones de los años 1911-12, 1917, 1929 y 1961. Las erupciones históricas han sido habitualmente acompañadas por numerosos flujos piroclásticos de bloques y ceniza, además de lahares calientes y fríos que han escurrido, preferentemente, hacia los ríos Tepú, Blanco Norte, Caliente - Hueñuhueñu, Este, Colorado y Blanco Sur. Las condiciones actuales sugieren que la generación de columnas eruptivas con alturas mayores a 15 km s.n.m continúan siendo eventos probables en el corto plazo, en cuyo caso cabe la posibilidad de colapsos parciales de éstas, produciendo flujos piroclásticos de moderado alcance en torno al volcán. Idéntica relevancia adquiere la posibilidad de lahares a través de los cursos fluviales principales, los que pueden alcanzar los lagos Llanquihue y/o Chapo. La ocurrencia de eventos explosivos considerables pueden generar dispersión y acumulación de importante cantidad de material piroclástico, concentrado preferentemente hacia los cuadrantes N, NE y E.



**Exposición/Riesgo específico**

La zona considerada como área de peligro en las condiciones actuales se circunscribe al sector interno que contiene a las áreas afectadas en la fase más intensa de la erupción. Los procesos esperados corresponden a la eyección de piroclastos balísticos, flujos piroclásticos asociados a colapsos de columnas eruptivas y/o colapsos parciales de domos y su posterior transformación en lahares. Adicionalmente, lahares secundarios podrían afectar más allá de la zona proximal a lo largo de los cauces que drenan directamente del edificio volcánico o en otros sectores con acumulación significativa de material piroclástico.

**3. Conclusión:**

En general, la actividad sigue presentando valores promedios considerados bajos. Sin embargo, el sistema volcánico continúa con un comportamiento fluctuante en los últimos días, con una tendencia a la baja, sugiriendo que el sistema volcánico aún permanece inestable, que podría evolucionar hacia un nuevo pulso eruptivo en un corto plazo. Por lo tanto, continúa la probabilidad de evolución hacia condiciones que favorecen una reactivación de la actividad eruptiva, y se sugiere mantener la restricción de acceso a la zona de alto peligro próxima al volcán. Por otra parte, el material piroclástico inestable acumulado en la parte superior del volcán y en sus laderas, así como en sectores aledaños, **podría ser removilizado por lluvia** dando origen a lahares secundarios a lo largo de los ríos que drenan del volcán y las cuencas vecinas. Los 'lahares secundarios' son aluviones volcánicos causados por la removilización parcial de material piroclástico depositado durante o de manera posterior a una erupción, normalmente causados por precipitaciones intensas. De esta forma, se sugiere prestar especial atención a la ocurrencia de estos fenómenos debido al pronóstico de lluvias durante los próximos días, particularmente en los cauces que descienden del volcán, en una **franja de 200 m** de ancho a cada costado de ellos, y en otros sectores donde hay acumulación importante de material piroclástico. Debido a lo anterior se mantiene la alerta técnica en **ROJO**.

Reporta	OVDAS-RNVV	Recepción:
---------	------------	------------



# Sernageomin - Red Nacional de Vigilancia Volcánica

## Mapa de Peligros Volcánicos

### Volcán Calbuco, 15 de Mayo de 2015

